



Le streptocoque à l'école

Le streptocoque du groupe A (SGA) est une bactérie qui peut causer plusieurs types d'infections, allant de bénignes à graves.

Les formes les plus fréquentes chez les enfants :

1. Pharyngo-amygdalite : fièvre, mal de gorge, ganglions enflés
2. Scarlatine : éruption cutanée, langue framboisée
3. Impétigo : lésions purulentes et croûteuses sur la peau
4. Cellulite : rougeur, chaleur, douleur au site infecté

**** Les formes graves (invasives) sont rares mais sérieuses : méningite, fasciite nécrosante, choc toxique, septicémie.**

Transmission :

- Par contact direct ou indirect avec des sécrétions ou lésions
- Par gouttelettes (toux, éternuements)
- Par aliments contaminés (rare)

Diagnostic :

- Test rapide de détection
- Culture de gorge ou de lésions

**** Imagerie pour les cas graves**

Il est possible de prendre rendez-vous via ClicSanté pour effectuer un dépistage

CLIC
SANTÉ

Traitement :

- Antibiotiques
- Analgésiques et antipyrétiques pour soulager les symptômes

**** Chirurgie parfois nécessaire pour les infections invasives**

Contagiosité :

- Jusqu'à 24 h après le début du traitement antibiotique
- Sans traitement, la contagiosité peut durer plusieurs semaines

À l'école :

- L'enfant doit être exclu pendant au moins 24 h après le début du traitement
- Les lésions d'impétigo doivent être couvrables avec un pansement propre et étanche

Prévention :

- Hygiène des mains
- Hygiène respiratoire
- Nettoyage des surfaces et objets



**** Cette maladie infectieuse doit être communiquée à l'infirmière scolaire. Vous devez informer le secrétariat, qui nous transmettra l'information.**