



L'oxyurose chez les enfants d'âge scolaire

L'oxyurose est une infection intestinale causée par un petit ver blanc (*Enterobius vermicularis*), souvent appelé oxyure. Les femelles pondent leurs œufs autour de l'anus, surtout la nuit.

Qui est le plus touché ?

Les enfants de 5 à 14 ans sont les plus souvent infectés, surtout ceux qui fréquentent les services de garde. L'infection se transmet facilement dans les familles.

Symptômes fréquents :

- Démangeaisons à l'anus, surtout la nuit
- Irritabilité, sommeil agité
- Parfois, démangeaisons vulvaires ou vers visibles dans les selles

Transmission :

- Par les mains (œufs sous les ongles)
- Par contact avec la literie, les vêtements, les serviettes ou les aliments contaminés
- Par auto-inoculation (l'enfant se réinfecte lui-même)

Traitement :

- Médicaments disponibles sans prescription (ex. : pyrantel, mébendazole)
**** Consulter le pharmacien pour plus d'information ****
- Deux doses à 14 jours d'intervalle
- Traiter toute la famille en même temps, même sans symptômes



Mesures d'hygiène essentielles :

- Garder les ongles courts
- Se laver les mains souvent, surtout avant les repas et après les toilettes
- Ne pas se ronger les ongles ni porter les mains à la bouche
- Changer de sous-vêtements et de pyjama tous les jours
- Prendre une douche le matin (préférable au bain)
- Laver la literie à l'eau chaude et passer l'aspirateur dans les chambres
- Éviter de secouer les draps et vêtements

À noter :

- L'enfant peut continuer à fréquenter l'école ou le service de garde s'il est traité et respecte les mesures d'hygiène
- Il n'existe pas de vaccin contre l'oxyurose

**** Cette maladie infectieuse doit être communiquée à l'infirmière scolaire. Vous devez informer le secrétariat, qui nous transmettra l'information.**